

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

EPS425(717)

Presakral ve bacak yerleşimli glomus tümörü, nadir yerleşimli 2 adet olgu sunumu

Seda Eryiğit Kokko¹, Anıl Aysal Ağalar¹, Özgül Sağol¹, Seymen Bora², Haluk Vayvada³, Burçin Tuna¹

¹ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

² Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

³ Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Glomus tümörü, genellikle parmak ve tırnak yatağında görülen perivasküler (perisitik) bir tümördür. Bu tümörün glomus cisimciklerinden geliştiği ve genellikle dijital alanlardaki Sucquet-Hoyer kanalından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu tümörler genellikle benign olup bazen malignite potansiyeli belirsiz ve malign olarak da görülebilmektedir. Literatürde presakral bölgede ve bacakta bildirilen birkaç olgu vardır.

Olgular: 34 yaşında kadın hastada, yaklaşık 1 aydır hareket ile artan ağrı şikayetiyle ile hastanemize başvurması üzerine görüntülemeye rektum posteriorunda yerleşim gösteren 10 cm çapında kistik lezyon saptanmıştır. Eksize edilen kitle makroskopik olarak 9x7x1.5 cm boyutunda olup perfore, kistik, iç yüzü kanamalı ve düzensiz görünümündedir.

42 yaşında, dış merkezde bacak yerleşimli cilt altı kitle nedeniyle operasyon öyküsü bulunan erkek hasta insizyon skarı altında kitle nedeniyle hastanemizde yeniden opere edilmiştir. Kitlenin makroskopik incelemesinde 2x2x1.5 cm boyutunda düzensiz görünümde ortası fibrotik kistik doku saptanmıştır.

Mikroskopik olarak her iki kitlenin kesitlerinde daha çok damar çevresinde yerleşim gösteren sitoplazmik sınırları belirgin, küçük

yuvarlak monoton hücreler dikkati çekmektedir. Yapılan immünohistokimyasal incelemelerde bu

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



hücreler vimentin, aktin, kalponin ve kadesmon ile boyanmıştır. Her iki olgu da mevcut bulgular ile glomus tümörü ile uyumlu bulunmuştur. İlk olgu derin yerleşimli ve 2 cm'den büyük olması nedeniyle "malignite potansiyeli belirsiz" grubunda yer almaktadır.

Sonuç: Glomus tümörünün oldukça nadir yerleşimli birer örneği olan olgularımız, bu tümörün bu nadir lokalizasyonlarda da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler :Glomus, presakral, bacak, kist