

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Meme Patolojisi

EPS472(960)

ÜÇ FARKLI KOMPONENT İÇEREN MEME TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE MİKST MEME KARSİNOMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Eda Gökalp Satıcı¹, Ferah Tuncel Daloğlu¹, Emre Çağatay Köse¹

¹ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

AMAÇ

Merkezimizde son 10 yılda tanı konulan mikst meme karsinomları ve literatürdeki mikst meme karsinomlarının gözden geçirilerek karşılaştırılması ve üç farklı komponent içeren bir mikst meme karsinomu olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Mersin Üniversitesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarında tanı konulmuş olan tüm meme karsinomu vakaları, otomasyon sistemi üzerinden taranmıştır. Bu vakalar içerisindeki mikst meme karsinomları ayrıca taranmış ve komponentlerine göre ayrılarak oranlanmıştır. Ayrıca 2011 yılında tanı konulmuş olan, üç komponentli bir mikst meme karsinomu olgusu arşivden taranmış ve hazır boyalı camları incelenmiştir.

BULGULAR

Memenin mikst karsinomları malign meme tümörlerinin %1'ini oluşturmaktadır. 3 komponentin bir arada bulunduğu mikst meme karsinomları ise literatürde daha az sayıda bulunmaktadır. Biz de merkezimizde tanı almış 3 komponent içeren bir olgu yanı sıra son 10 yılda laboratuvarımızda tanı konulmuş olan tüm mikst meme karsinomlarını araştırdık ve literatürdeki mikst meme karsinomları ile karşılaştırdık.

1 Ocak 2008'den günümüze dek, merkezimizde 2487 malign meme tümörü tanısı almış vakanın %2.2'si mikst meme karsinomudur. Literatürde ise bu oran %1'in altındadır.

44 yaşındaki kadın hasta, dış merkezde opere olmuş ve konsültasyon amacıyla patoloji bölümünden hazır bloklarını konsültasyon amacıyla laboratuvarımıza getirmiştir. Mikroskopik değerlendirme sonucunda mikst invaziv karsinom tanısı alan olgumuzun komponentleri; duktal, lobüler ve mikropapiller karsinom olarak belirlenmiştir.

SONUÇ

Meme karsinomlarında histolojik tipin prognoza ve tedaviye etkisi düşünüldüğünde, mikst meme

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



karsinomlarının tanınması ve komponentlerinin doğru bir şekilde ayırt edilmesinin son derece önemli olduğu görülmektedir. Bu komponentlerin hem makroskopik, hem de mikroskopik olarak ayırt edilmesi ve ikiden fazla komponentin olabileceğinin akılda tutulması yararlı olacaktır. Ayrıca komponentlerin sadece biri de metastaz yapabileceğinden, metastaz alanındaki komponentten bağımsız olarak tümörde her zaman farklı komponentlerin varlığı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Mikst karsinom, mikropapiller karsinom, meme