

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Meme Patolojisi

EPS469(1039)

Meme karsinomu nedeni ile yapılan rezeksiyon materyallerinde demografik, klinik ve patolojik özellikler

Zeynep Sezal¹, Adile Adıllı¹, Zuhal Gücin¹, Nur Büyükpınarbaşılı¹

¹ Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Zeynep Sezal*, Adile Adıllı*, Zühal Gücin*, Nur Büyükpınarbaşılı*

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Meme karsinomu nedeni ile yapılan cerrahi rezeksiyon materyallerinde demografik, klinik ve patolojik özellikleri dökümanete etmek.

Gereç ve Yöntem: 2012 Ocak-2018 Haziran tarihleri arasında bölümümüze gelen neoadjuvan tedavi almamış olan meme karsinomlarına ait cerrahi rezeksiyon materyalleri ele alındı. Olgulara ait yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri hasta dosyalarından; kanserli vakaların sağ-sol meme yerleşimi ile kadran lokalizasyonları klinik ve radyolojik kayıtlardan; histolojik tipleri, hormon reseptör ve HER2 protein ekspresyon durumları patoloji raporlarından elde edildi.

Bulgular: Tarama sonucunda 528 vakada kanser saptandı. Kanserli vakaların 526'sı kadın (%99,6), 2'si erkek (%0,4) idi. Kadınlarda yaş aralığı 26 ile 94 (ortalama 58,3) idi. Erkeklerde yaş ortalaması 79 idi (72 ve 86). 259 olgu sağ meme (%49,05), 263 olgu sol meme (%49,81), 6'sı bilateral (%1,1) yerleşimliydi. Tümör 210 hastada (%39,8) üst dış kadran, 59 hastada (%11,2) üst iç kadran, 56 hastada (%10,6) alt dış kadran, 23 hastada (%4,35) alt iç kadranda idi. 38 hastada (%7,2) santral bölge, 36 hastada (%6,82) üst orta kadran, 11 hastada (%2,08) alt orta kadran, 6 hastada (%1,1) alt kadran, 6 hastada (%1,1) üst kadran, 11 hastada (%2,08) dış kadran, 31 hastada (%5,8) dış orta kadran bölgesinde olarak tanımlanmış olup 41 hastada (%7,76) multifokal tutulum bildirilmiştir.

Nonspesifik tipte invaziv meme karsinomu 451 olguda (%85,5); invaziv lobüler karsinom 31 olguda (%5,8), müsinöz karsinom 15 olguda (%2,8); invaziv papiller karsinom 10 olguda (%1,8), invaziv kribriform karsinom 6 olguda (%1,1), metaplastik karsinom 6 olguda (%1,1), tubüler karsinom 6 olguda (%1,1), invaziv mikropapiller karsinom 2 olguda (%0,3),

medüller karsinom 1 olguda (%0,1) görülmüştür.

Sonuç: Üst dış kadran en sık görülen lokalizasyondur (%39,8). Santral bölüm %7,2 ile oldukça önemli bir yer tutar. %8'e yakın oranda multifokal yerleşim görülür. Histolojik olarak büyük kısmı spesifik bir tipe girmeyen invaziv karsinomlar oluşturur. Özel tipte olanlar invaziv lobüler ve müsinöz karsinomlar başta olmak üzere yer alırlar. Bulgularımız bu konudaki genel bilgiler ile uyumludur.

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



Anahtar Kelimeler : meme karsinomu, meme karsinomu yerleşimi, meme karsinomu histolojik tipleri