

27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Dermatopatoloji

PS610

DERİ EKİ TÜMÖRLERİNİN PREVALANSI: 2006-2016 YILLARINI KAPSAYAN RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Ayşe Mine Önenek¹, Burcu Sanal Yılmaz¹, Bülent Özgür Dokanakolu¹

¹Karaman Devlet Hastanesi

Amaç: Deri eki tümörleri insidansı düşük ve çoğunluğu benign tümörlerdir. Ancak nonmelanositik deri tümörleri ile kesişebilen zengin histomorfolojileri nedeniyle patoloğlar için tanısal zorluğa neden olabilirler. Çalışmamızda bu tümörlerin prevalansını ve klinikopatolojik özelliklerini geniş bir seride incelemek amaçlanmıştır.

Materyal ve metodlar: Karaman Devlet Hastanesi Patoloji bölümü arşivi kayıtları 2006-2016 yılları arasında non-neoplastik ve neoplastik deri eki lezyonları açısından tarandı. Blok ve lamalarına ulaşılabilen tüm olgular çalışmaya alındı. Yaş, cinsiyet ile lezyonun boyutu, yerleşimi ve histopatolojik tanısı olgulara ait raporlardan elde edildi.

Bulgular: 2006-2016 yılları arasında patoloji laboratuvarında değerlendirilmiş toplam 276 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların 156'sı kadın, 120'i erkek olup, ortalama yaşları 41,1'dir (1-92 yaş). Bu olgulara ait incelenen deri eki lezyonu sayısı 280'dir. En sık yerleşim bölgesi baş boyundur (n=201). Bunu sırasıyla üst ekstremité (n=29), gövde (n=16) ve alt ekstremité (n=13) izlemektedir. Ortalama lezyon boyutu 1,2 cm'dir (min: 0,2cm- max: 8cm). %75,4'ü (n=214) neoplastik, %24,6'sı (n=70) non-neoplastik lezyonlardır. %51,1'i (n=143) folikül, %22,9'u (n=64) sebace, %21,1'i (n=59) ekrin, %6,4'ü (n=18) ise apokrin diferansiasyon göstermektedir. En sık görülen benign neoplastik lezyon pilomatriksoma'dır. Olguların %2,1'i (n=6)'si malign olup çoğu (n=3) ekrin yönünde diferansiyedir (2 porokarsinom ve 1 malign nodüler hidradenom). Malign olguların tümü erkektir. Malign olguların ortalama yaşı 67,3 (34-92), benign olgularınki ise 41,3'tür (1-87).

Sonuç

Deri eki tümörlerini içeren en büyük serilerden biri olan bu çalışma, literatürle uyumlu olarak, bu tümörlerin büyük bir kısmının baş boyun bölgesinde lokalize ve benign olduğunu göstermiştir. Malign olgular oldukça nadir olmakla birlikte belirgin olarak daha ileri yaşlarda ve erkek hastalarda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Deri eki tümörleri prevalansı, malign trikoepitelyoma