

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Gastrointestinal Patoloji

EPS228(835)

Özefagusda heterotopik sebasöz gland (HSG)

Gülşah Akgül¹, Haldun Umudum², Mehmet Çoban³

¹ Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

² Ufuk Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

³ Ufuk Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ

Özefagusda HSG'ler, endoskopide insidental olarak saptanan asemptomatik lezyonlardır. Endoskopi sırasında; tek veya çok sayıda, sarı renkli, küçük nodüller şeklinde izlenirler. Histopatolojik olarak derideki sebace glandlar ile aynı görünümündedirler.

OLGU

56 yaşında kadın hastanın yapılan rutin endoskopisinde özefagusun 27. cm'inde sarı-beyaz renkli nodül saptanmıştır. Nodülden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde; skuamöz hücreler içinde, berrak sitoplazmalı sebasöz hücrelerden oluşan gruplar izlenmiştir. Biyopsi sonucu HSG olarak rapor edilmiştir.

SONUÇ

HSG'ler, klinik olarak glikojenik akantoz ile karıştırılabilirler. Ayrımı, histopatolojik inceleme ile sağlanır. Lezyon; sık görülmele birlikte, akılda tutulmadığı zaman biyopsi materyallerinin karıştırılmış veya kontamine olabileceğini düşündürebilir.

Anahtar Kelimeler :heterotopi, sebasöz, özefagus, glikojenik akantoz