

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Meme Patolojisi

PS336

OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE GRANÜLOMATÖZ LOBÜLER MASTİT BİRLİKTELİĞİ

Mine Özşen¹, Şahsine Tolunay¹

¹Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.

Giriş

Granüloamatöz lobüler mastit ilk kez 1972 yılında Kessler ve Wolloch tarafından tanımlanmış nadir bir kronik meme hastalığıdır.

Etiyolojisi net olarak aydınlatılmamış olan lezyonda, mikroorganizma içermeyen non kazeifiye granülomların bulunması karakteristiktir.

Genellikle kitle lezyonu şeklinde semptom veren hastalık, klinik ve radyolojik olarak meme karsinomunu taklit edebilir. Ayırıcı tanısında karsinoma ve diğer granüloamatöz iltihap yapan nedenlerin akılda tutulması gerekmektedir.

Olgu

35 yaşında kadın hasta, yaklaşık 9 ay önce bir süreden beri devam eden sağ memede şişlik şikayeti ile dış merkeze başvurmuştur. Yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler doğrultusunda, antibiyotik tedavisi uygulanan olgu bu tedaviden yarar görmemesi üzerine hastanemiz genel cerrahi kliniğine yönlendirilmiştir.

Hastanemizde yeniden değerlendirilen olguya çekilen ultrasonografi sonucunun granüloamatöz mastit düşündürmesi üzerine steroid tedavisine başlanmış ancak bu tedaviden de yarar görmemesi üzerine eksizyon planlanmıştır.

Patoloji laboratuvarımıza gönderilen eksizyon materyalinin makroskopik değerlendirmesinde; kesit yüzeylerinde yer yer gri beyaz renk değişim alanlarının olduğu saptandı.

Hazırlanan kesitlerin histopatolojik incelemesinde; lobüle sınırlı non kazeifiye granülomların yanı sıra 4 ayrı odakta bazal membranı aşmayan duktal lobüler sistemde sınırlı neoplastik epitelyal hücre proliferasyonu ve bu hücrelerde kribriform yapılanma dikkati çekti.

Yapılan histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler doğrultusunda olguya granüloamatöz mastit ve insitu duktal karsinoma tanısı verildi.

Sonuç

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Granüloamatöz lobüler mastit, hemen her zaman genç doğurgan kadınlarda görülen, sıklıkla da yeni gebelikle ilişkili inflamatuvar bir hastalıktır.

Granüloamatöz lobüler mastit tanısı; histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirmeye dayanmaktadır. Histopatolojik değerlendirmede çoğu kez nötrofil içeren başlıca lobulosentrik granüloamların varlığı karakteristiktir. Granüloamlarda nekroz görülebilir ancak kazeifikasyon nekrozu görülmez.

Klinik ve radyolojik olarak karsinoma ile karışabilen bu lezyonun duktal karsinoma ile birlikteliği oldukça nadirdir. Kronik inflamasyonun kansere neden olduğu bilinmekle birlikte granüloamatöz lobüler mastit zemininde karsinoma gelişip gelişmediği, henüz tartışma konusudur. Granüloamatöz lobüler mastitten kaynaklanan meme kanserinin patogenezi henüz aydınlatılamamıştır.

Bizim olgumuz çok nadir ve patogenezi tartışmalı olan insitu duktal karsinoma ve granüloamatöz mastit birlikteliği olarak sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Granüloamatöz lobüler mastit, İnsitu duktal karsinoma, Mastit