

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

PS376

MEMEDE NODÜLER FASİİTİS; OLGU SUNUMU

Muzaffer İlkyay Tosun¹, Cumhur Selçuk Topal¹, Müberra Seğmen Yılmaz¹, Şenay Çetin¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş

Noduler fasiitis genellikle genç erişkinlerde subkutan yerleşimli hızlı büyüyen kitleler olarak görülen lezyonlardır. En sık ekstremitelerde, göğüs, sırt gibi lokalizasyonlarda karşımıza çıkar ve artmış selülerite ve mitotik figür nedeni ile sarkom tanısı alabilir.

Olgu

39 yaşında kadın hasta, hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği' ne mastodini şikayeti ile başvurmuş, yapılan ultrasonografide sol memede 12 mm çapında düzensiz sınırlı kitlesel lezyon saptanmıştır. Yapılan Trucut biyopside fibroepitelyal neoplazm tanısı alıp kitle eksizyonu uygulanmıştır. Histolojik kesitlerde miksoid bir stroma içerisinde storiform paternde fibroblastik proliferasyon, zeminde kronik inflamatuvar hücreler ve eşlik eden mikrohemoraji alanları dikkat çekmiştir.Yapılan immunhistokimyasal incelemede Smooth Muscle Actin (SMA) pozitifliği fibroblastik kökeni destekler nitelikte idi. Olgu morfolojik ve immunhistokimyasal bulgular ışığında miksoid mezenkimal neoplazm/ nodüler fasiitis lehine yorumlanmıştır.

Sonuç

Nodüler fasiitis tipik olarak hızlı büyüme öyküsü olan ve ekstremitelerde , gövde yerleşimini seven bir antite olarak bilinmekle birlikte literatürde nadir olarak bildirilmiş meme lokalizasyonlu olgularda meme kansinimleri ile ayırıcı tanıya girebilmektedir. Bu nedenle tarafımızca sunuma değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Noduler fasiitis, meme