

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Üropatoloji

EPS608(459)

Üretranın nadir bir lezyonu: Skuamöz hücreli papillom, iki olgu sunumu

Sevim Baykal Koca¹, Gülben Erdem Huq¹, Burcu Güzelbey¹, Nejdet Karşıyakalı²

¹ Sbü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

² Sbü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Üretranın nadir bir lezyonu: Skuamöz hücreli papillom, iki olgu sunumu

GİRİŞ

Üretral meatus çevresi yerleşimli lezyonlar oldukça yaygındır. Bunlar arasında üretral karünkül, üretral prolapsus, üretral divertikulum, periüretral gland absesi ve üretral karsinom yer almaktadır. Skuamöz hücreli papillom ise bir çok lokalizasyonda sık görülen bir lezyon olmakla birlikte üretrada oldukça nadirdir.

Klinik önemi belirsizdir. Bildirimizde üretral meatus yerleşimli skuamöz hücreli papillom tanısı alan iki kadın hastamız literatür eşliğinde sunulmaktadır.

OLGU

İlk hastamız 10 aydır dizüri, noktüri, pollakiüri şikayetleri olan, antibiyotik tedavisi ile şikayetleri gerilemeyen ve 1.5 aydır mevcut şikayetlerinin artması üzerine hastanemiz üroloji polikliniğine başvurmuş 29 yaşında kadın hasta. Bilinen kronik hastalık öyküsü bulunmayan hastanın, yapılan fizik muayenesinde eksternal meatus saat 6 hizasında, vajen anterior yüze yakın kesimde 5 mm' lik lezyon gözlenmiş ve cerrahi eksizyon uygulandı. Mikroskopik incelemede fibrovasküler kor içeren benign papillomatöz skuamöz epitel proliferasyonu izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede p16 ve human papilloma virüs (HPV) ile boyanma izlenmedi.

İkinci hastamız dizüri ve noktüri şikayetleri olan 56 yaşında kadın hasta. Fizik muayenesinde eksternal meatustan protrude olan polipoid lezyon gözlenmiş ve cerrahi eksizyon uygulandı. Diğer eksternal genital bölgelerde herhangi bir patoloji saptanmadı. Mikroskopik incelemede proliferatif benign skuamöz epitel ile döşeli, fibrovasküler kor içeren papillomatöz yapılar izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede P16 ve HPV ile boyanma izlenmedi.

SONUÇ

Üretranın skuamöz hücreli papillomu, dizüri gibi alt üriner septomlarla bulgu veren, kayda değer malignite riski bulunmayan, nadir, benign proliferatif skuamöz lezyonudur. Kesin tanı ve tedavi için cerrahi eksizyon ve dikkatli patolojik inceleme gerekmektedir. Bu lezyon üretrada çok nadir olduğundan

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



biz literatür eşliğinde üretral skuamöz papillom tanısı alan iki olgumuzu sunuma değer bulduk.

Anahtar Kelimeler :üretra, skuamöz, papillom